

Nebulizadores

Los nebulizadores se utilizan para tratar el asma dispersando partículas (formando gotas pequeñas) de medicamento líquido para que pueda entrar bien a los pulmones. Es importante saber cómo utilizar un nebulizador apropiadamente para un mejor rendimiento.

¿Cómo hacer un tratamiento con nebulizador?

1. Para realizar un tratamiento, una la manguera del compresor a la copa.
2. Coloque el medicamento en la copa y una la boquilla o máscara.
3. Al encender el compresor se debe formar un vapor liviano.
4. Si utiliza la boquilla, cierre la boca completamente alrededor de la misma.
5. Respire lenta y profundamente y no hable hasta terminar todo el medicamento.
6. Mantenga siempre la copa en forma vertical, golpeándola si el medicamento hace espuma. El tratamiento dura alrededor de 10 a 15 minutos.

¿Cómo cuidar su equipo?

La mayoría de los nebulizadores consisten de un compresor o motor unido a una manguera y una copa de nebulización. La única función del compresor es bombear aire hacia la copa de nebulización. Debe mantenerse limpia y libre de polvo. Generalmente tiene un filtro de admisión que debe cambiarse regularmente.

La copa del nebulizador es el lugar donde debe colocarse el medicamento. Se desenrosca en el medio para colocar el medicamento. Muchas de las copas tienen una pequeña pieza de plástico llamada deflector que forma vapor cuando el aire pasa a través de éste.

Si el deflector no está o se ha dañado el nebulizador no funcionará.

Recuerde que las bacterias que se encuentren en la copa pueden ingresar en los pulmones, por lo tanto manténgala limpia. Después de cada tratamiento con el nebulizador, desarme la copa y la boquilla, colóquelas en agua con jabón durante 15 minutos, enjuague cuidadosamente y deje secar al aire.

Consulte los manuales de los fabricantes en el inserto del envase para obtener información sobre cuanto tiempo deben durar las copas antes de desecharlas.

