

Lista de Vacunas para Adolescentes 11-19 Años de Edad

VACUNA	DOSIS	TIEMPO DE INMUNIZACIONES
Hepatitis B ¹	3 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1 mes después de la 1ra. dosis 3ra. dosis 4-6 meses después de la 2da. dosis
Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR) ²	2 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1 mes después de la 1ra. dosis
Varicela ³	2 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1-3 meses después de la primera dosis dependiendo de la edad
Hepatitis A ⁴	2 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 6-12 meses después de la 1ra. dosis
Gripe (Influenza) ⁵	1 dosis	1 dosis anualmente
Neumocócica ⁶	1 dosis	1 dosis para adolescentes con alto riesgo
Meningocócica ⁷	1 dosis	1 dosis es recomendada a los 11-12 años de edad y para estudiantes universitarios de primer año que viven en dormitorios
Tosferina (Tdap) ⁸	1 dosis	1 dosis Tdap es recomendada a los 11-18 años de edad
Virus del Papiloma Humano (VPH) ⁹	3 dosis	1ra. dosis 2da. dosis 1-2 meses después de la 1ra. dosis 3ra. dosis 6 meses después de la 1ra. dosis

Vea el lado reverso para recomendaciones detalladas.

1. Hepatitis B: Tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B son necesarias para una protección completa. Una vacuna con dos dosis (doble) contra la Hepatitis B está disponible para los adolescentes de 11-15 años de edad.

2. Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR en inglés): Se recomienda dos dosis de la vacuna triple vírica para proporcionar una protección completa para las personas entre 7-18 años de edad que no hayan sido previamente vacunadas. La vacuna MMR no se debe dar a las adolescentes que están embarazadas o que están pensando en quedar embarazadas dentro de un mes de la vacunación.

3. Varicela (Chickenpox): La vacuna contra la varicela es recomendada para cualquier persona que no ha tenido varicela o no ha recibido la vacuna de la varicela. Se recomiendan dos dosis de la vacuna contra la varicela dadas tres meses aparte para niños menores de 13 años de edad. Los adolescentes de 13 años de edad y mayores deben recibir dos dosis con un intervalo de cuatro semanas entre las dosis. La vacuna contra la varicela no debe administrarse a las adolescentes que están embarazadas o que están pensando en quedar embarazadas dentro de un mes de la vacunación.

4. Hepatitis A: Se recomienda para niños mayores con ciertas condiciones médicas o para personas que están con mayor riesgo de infección, o para cualquiera que desee la inmunidad contra la hepatitis A.

5. Gripe (Influenza): Se recomienda una vacuna anual contra la gripe para todas las personas de 6 meses de edad y mayores y en especial para aquellos con un graves problemas de salud como asma, diabetes o enfermedades del corazón.

6. Neumocócica: Una dosis única de la vacuna antineumocócica conjugada se recomienda para niños de 6-18 años de edad con ciertas condiciones médicas. La vacuna antineumocócica polisacárida también se puede recomendar para niños de 2 años de edad con ciertas condiciones médicas subyacentes.

7. Meningococcal: La vacuna meningocócica se recomienda para los adolescentes de 11-12 años de edad con una dosis de refuerzo a los 16 años de edad. Una dosis se recomienda para los adolescentes de 13-18 años de edad que no estén vacunados previamente. Los adolescentes que recibieron la dosis por primera vez durante los 13 a 15 años de edad deben recibir una dosis de refuerzo a los 16-18 años de edad. Se recomienda una dosis para estudiantes universitarios de primer año, previamente no vacunados, que viven en un dormitorio.

8. Tosferina (Tdap): Los adolescentes entre 11-18 años de edad que no han recibido la vacuna Tdap deben recibir una dosis única de vacuna Tdap seguido por dosis de refuerzo de Td cada 10 años. La vacuna Tdap se puede administrar independientemente de la fecha en la que se le dio la última vacuna antitetánica y la vacuna contra la difteria toxoide. Los adolescentes no vacunados o que estén atrasados con este esquema deben recibir tres dosis de Td con una dosis única de Tdap sustituyendo una de las dosis en la serie.

9. Virus del Papiloma Humano (VPH): La vacuna contra el VPH se recomienda para las mujeres a los 11-12 años de edad y puede ser dada a los hombres entre los 26-29 años de edad. Se recomienda ponerse al día en la vacunación para las mujeres entre 13 a 26 años de edad que no hayan sido previamente vacunadas o que no hayan completado la serie completa de vacunación.