



PROTECT AGAINST HEPATITIS A



PREVENT ILLNESS

Practice good personal hygiene, especially after visiting a restroom: wash hands thoroughly with soap and warm water.

Thoroughly and regularly disinfect public and employee areas using the guidelines below.

Encourage employees to receive a hepatitis A vaccine. Make an appointment at 385-468-SHOT (7486) or visit a local pharmacy or your health care provider.

Watch for symptoms of hepatitis A and visit your health care provider if you observe any. Symptoms include nausea, vomiting, abdominal pain, and jaundice (yellow skin or eyes).




USE AN EFFECTIVE DISINFECTANT

Chlorine bleach **is** effective against hepatitis A. Most quaternary ammonium disinfectants are **NOT** effective against hepatitis A, unless the label specifically states that it is.

Mix 1 and 2/3 Cup unscented bleach in 1 Gallon of water.

Use disinfectant solution within 20 minutes of mixing.

Allow 1 minute of contact time. For food contact or kitchen surfaces, **rinse with water after disinfecting.**




SANITIZE OFTEN

Focus on frequently touched surfaces:


- Toilet flush handles and bathroom faucets, sinks, and counters
- Light switches and plates
- Doorknobs
- Railings
- Cash registers and computers
- Kitchen faucets, sinks, and counters
- Stove and microwave controls
- Remote controls
- Tables and chairs
- Phones

PROTEGER CONTRA LA HEPATITIS A



PREVENIR ENFERMEDADES

Practique una buena higiene personal, especialmente después de visitar un baño: lávese bien las manos con jabón y agua tibia.



Desinfecte minuciosa y regularmente las áreas públicas y de los empleados utilizando las pautas a continuación.

Anime a los clientes a recibir una vacuna contra la hepatitis A. Haga una cita al 385-468-SHOT (7486) o visite una farmacia local o su proveedor de atención médica.

Esté atento a los síntomas de la hepatitis A y visite a su proveedor de atención médica si observa alguno. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal e ictericia (piel u ojos amarillos).

UTILICE UN DESINFECTANTE EFECTIVO

El blanqueador de cloro **es** eficaz contra la hepatitis A. La mayoría de los desinfectantes de amonio cuaternario **NO** son eficaces contra la hepatitis A, a menos que la etiqueta indique específicamente que es.



Mezcle 1 y 2/3 taza de lejía sin perfume en 1 galón de agua.

Utilice la solución desinfectante dentro de 20 minutos de mezclado.

Permita 1 minuto de tiempo de contacto. Para superficies de contacto con alimentos o cocina, enjuague con agua después de la desinfección.

SANITIZAR FRECUENTEMENTE

Concéntrese en superficies frecuentemente tocadas:

- Manijas de descarga de inodoro y grifos de baño, fregaderos y mostradores
- Interruptores y placas de luz
- Asideros de las puertas
- Barandas
- Cajas registradoras y ordenadores
- Grifería de cocina, fregaderos y mostradores
- Controles de estufa y microondas
- Controles remotos
- Mesas y sillas
- Teléfonos

